

上海崇明县药品检验所 倪学斌  
(崇明 202150)

将生薏苡仁粉碎成细粉,用95%乙醇水浴回流提取,蒸去乙醇,得乙醇提取物。提取物为淡黄棕色固体,将它配制成软膏,擦于扁平疣患处,数次后,疣体软化,用乙醇消毒的剪刀剪去软化的部分,再擦上软膏,再剪去软化部份,如此反复多次,扁平疣逐渐消失,长成正常皮肤。本人在左手大拇指和左足底先后患扁平疣,经西医用苯甲酸治疗,不能根治。用本法治疗,约1个月治愈,未见复发。现将软膏配制法介绍如下:

处方:

(1) 单硬脂酸甘油酯3.0g、十八醇2.0g、硬脂酸10.0g。

(2) 十二烷基磺酸钠10.0g、甘油5.5g、薏苡仁乙醇提取物4.0g、蒸馏水67g。

制法:将处方(1)加热至70℃,处方(2)加热至60℃,然后将处方(1)加入处方(2)中,边加边搅拌,降至室温,分装,即得。

### 1. 戴贝齿煨法

本品为贝壳类药材净制时将原药材拣净杂质,洗净泥土,晒干。煨制时可将紫贝齿口向下(贴锅底),按大小为序,由锅底向上排列。铁锅上加一铁盖,用大火烧煨,可听到爆裂声、煨至基本无声时、停止加热,待数min后。铲出紫贝齿,放冷,用时打碎。

优点:此法不用翻动,烧煨均匀,省时,省工,简单易行。

### 2. 水润马钱子切片法

本品为种子类药材,有大毒。炮制方法有砂炒、油炸等,然后除去绒毛入药。

通过实践体会,马钱子水润刮皮切片较好。可先将马钱子拣去杂质及霉烂,洗净泥土,置容器内,用清水泡润。每天换水2次,加水过药(夏季7至10d、冬季10至15d),用小刀刮去皮毛,趁软手工切片,晒或晾干即得。

优点:①此药因有大毒,注意用具及时清洗去毒。②此法省砂、节油。③饮片美观。

小经验

炮制经验二则

徐州市中医院 刘超  
(徐州 221009)

## 犀羚解毒片包衣之我见

山东省立医院药剂科 房广星  
(济南 250021)

目前市场上常见的犀羚解毒片有两种,一是糖衣片,一是未包衣片。一般均为塑料袋包装。

有些药物的性质不稳定,与空气中的氧、二氧化碳、水长期接触,易发生化学变化而改变甚至丧失药效。有些药物需要包肠衣,这是因为这些药物对胃有刺激作用或需在肠内崩解而又易被胃液破坏。也有些药物因有不良气味,易导致恶心呕吐而需包衣。包衣的主要目的即在于此。

犀羚解毒片为中药片剂,是治疗流行感冒(流行感冒)和风热感冒的有效成药。由于方中各药无不良刺激性气味,也不需在肠道吸收,加之塑料袋包装与外界隔绝,所以无包衣之必要。另外,中药本有吸收缓慢之弊,而针对流行感冒的特点若要及时尽量高地发挥药效,也以片剂能在胃内崩解完全为好。

笔者曾留心临床跟踪观察,绝大多数患者反映不包衣犀羚片治愈感冒快于包糖衣犀羚片。

## 金礞石炮制方法的改进

四川绵阳精神卫生中心 姜仲良  
(绵阳 321000)

金礞石为云母片岩的岩石,质地松脆,用于顽痰胶洁,喘息,癫痫及精神狂燥。一般应用时均经煨后使用。

煨法有2种。一为明煨法,另一为火硝煨法。前者载于《中国药典》1985年版,后者载于《四川省中药饮片炮制规范》1977年版。

笔者近2年来,用生铁锅煨制礞石,取得较为满意效果。其方法:每kg礞石,加入火硝0.4kg,砸细,混合均匀,置铁锅内,加铁盖。煨至火冒黄色烟雾时,用锅铲翻动,反复多次,直至药物完全变为金黄色,无黄烟冒出,硝尽为度。取出放冷,水飞。其优点,除得到质佳炮制品外,还能节省时间,节约燃料,受热均匀,不粘附容器,色泽一致,并且炮制品不会因容器故障而遇致损失,达到了安全炮制的目的。